

مادران و نوزادان - کودکان:

- ۱۰۱- خانم بارداری ۲۶ ساله با سن حاملگی ۸ هفته، به درمانگاه بارداری جهت دریافت مراقبت‌های دوران بارداری مراجعه کرده است، مراجعات بعدی این مددجو به درمانگاه، هر چند هفته است؟  
 ۱) ۲  
 ۲) ۳  
 ۳) ۴  
 ۴) ۵
- ۱۰۲- مادر بارداری جهت واکسیناسیون به درمانگاه بهداشت مراجعه کرده است. تزریق کدامیک از واکسن‌های زیر، برای این مادر الزامی است؟  
 ۱) سرخچه  
 ۲) کرزاز  
 ۳) تیفووید  
 ۴) مالاریا
- ۱۰۳- مریم و علی که پسرعمو و دخترعمو هستند و با هم عقد کرده‌اند، به مرکز مشاوره ژنتیک مراجعه کرده‌اند. بهترین زمان مشاوره چه زمانی است?  
 ۱) قبل از ازدواج فامیلی  
 ۲) بعد از ازدواج  
 ۳) بعد از تولد اولین نوزاد ناهنجار  
 ۴) دوران بارداری
- ۱۰۴- مادر ۲۵ ساله نخست‌زا فرزند دختری به دنیا آورده است. وی اکنون در بخش پس از زایمان بستری است. همه موارد زیر در جمیع شدن رحم مؤثر هستند، به جز.....  
 ۱) ماساژ رحم  
 ۲) تغذیه پستانی  
 ۳) مثانه پر  
 ۴) دریافت اکسی‌توسین
- ۱۰۵- خانم و آقای موسوی مدت ۵ سال است که سابقه ناباروری دارند. اکنون آنها جهت درمان به کلینیک مراجعه کرده‌اند. در بررسی علل ناباروری، کدامیک از علل زیر، مربوط به هر دو جنس است?  
 ۱) سیگار  
 ۲) ترس از ناباروری  
 ۳) قلیان  
 ۴) داروی ضد سرطان
- ۱۰۶- مددجو خانم ر - م با تشخیص مسمومیت بارداری در بخش پرهناتال بستری است و از درد ناحیه اپیگاستر شکایت می‌کند. علت این درد، آسیب به کدام ناحیه است?  
 ۱) مغز  
 ۲) کلیه  
 ۳) کبد  
 ۴) معده
- ۱۰۷- مددجو خانم ر - ج، ۴۰ هفته جهت زایمان در بخش پستراتی شده است پزشک تصمیم می‌گیرد زایمان مددجو از طریق سزارین انجام شود. علت این تصمیم پزشک چیست?  
 ۱) مانیتورینگ جنین  
 ۲) کاهش فشارخون  
 ۳) پارگی کیسه آب  
 ۴) تهوع و استفراغ
- ۱۰۸- پرستار در بررسی نوزاد با تشخیص دررفتگی مفصل ران (CDH)، به کدامیک از موارد زیر توجه می‌کند?  
 ۱) تغییرات ستون فقرات  
 ۲) ضعیف بودن رفلکس رقص  
 ۳) کوتاهی پای سالم  
 ۴) ناهمانگی چین‌های پشت در قسمت ران
- ۱۰۹- کودک نوپا در مواجه با استرس، معمولاً کدامیک از رفتارهای زیر را نشان می‌دهد?  
 ۱) بی‌اشتهاایی  
 ۲) رفتارهای قهقهایی  
 ۳) فرار از غریبه‌ها  
 ۴) فرار از والدین
- ۱۱۰- نوزادی در بخش زایمان به دنیا آمده است. دهان وی مملو از بzac بوده و سیانوزه است. پرستار با کدام تشخیص احتمالی، او را مورد بررسی قرار می‌دهد?  
 ۱) شکاف کام  
 ۲) ناهنجاری آنورکتال  
 ۳) هرنی دیافراگمی  
 ۴) آترزی مری
- ۱۱۱- کودکی ۴ ساله با تشخیص تومور ویلمز در بخش بستری شده است. مهم‌ترین مراقبت قبل از عمل جراحی که پرستار باید به آن توجه داشته باشد، کدام است?  
 ۱) بررسی علایم حیاتی بهویژه درجه حرارت  
 ۲) کنترل علایم حیاتی بهویژه درجه حرارت  
 ۳) خودداری از لمس غیرضروری شکم

- ۱۱۲- شایع‌ترین نوع سندروم نفروتیک در کودکان کدام است؟  
 ۱) سندروم نفروتیک با حداقل تغییرات (MCNS)  
 ۲) سندروم نفروتیک ثانویه  
 ۳) سندروم نفروتیک با عامل ناشناخته  
 ۴) سندروم نفروتیک مادرزادی
- ۱۱۳- اولین مرحله تئوری کوهلبرگ، مرحله پیش‌قراردادی است که شامل کدام دو بخش زیر است؟  
 ۱) کسب پاداش - رفع نیاز فردی  
 ۲) تنبیه - اطاعت  
 ۳) اخلاق قراردادی - اطاعت  
 ۴) رفع نیاز فردی - تنبیه
- ۱۱۴- پرستار در بررسی کودک ۱۸ ماهه، کدام عمل کودک را تکامل فیزیکی طبیعی در نظر می‌گیرد؟  
 ۱) لی لی کردن  
 ۲) قرار دادن ۸ بلوک بر روی هم  
 ۳) تطبیق با بحران  
 ۴) کشیدن اسباب بازی
- ۱۱۵- مرحله پیش‌عملیاتی، چه زمانی در کودک شکل می‌گیرد و براساس نظر کدام نظریه پرداز است؟  
 ۱) قبل مدرسه - پیازه  
 ۲) مدرسه - کوهلبرگ  
 ۳) نوپایی - اریکسون  
 ۴) خردسالی - فروید

روان‌پرستاری:

- ۱۱۶- مرگ نزدیکان، طلاق و ازدست دادن، در کدام بحران قرار می‌گیرد؟  
 ۱) تکاملی  
 ۲) ناخواسته  
 ۳) موقعیتی  
 ۴) داخلی
- ۱۱۷- بروز بحران رشد از نظر زمانی، در چه هنگام است?  
 ۱) در مرحله سالمندی  
 ۲) انتقال از یک مرحله رشد به مرحله دیگر  
 ۳) در مرحله میانسالی  
 ۴) طی دوران بلوغ
- ۱۱۸- در سایکوسیس (psychosis)، کدام مورد زیر، دچار اختلال می‌شود؟  
 ۱) عملکردی  
 ۲) واقعیت  
 ۳) شخصیتی  
 ۴) روابط بین فردی
- ۱۱۹- در زمان بروز اضطراب، بدن چه تظاهراتی نشان می‌دهد؟  
 ۱) تاکی کاردیا، گشاد شدن مردمک، تاکی کاردیا، تکرر ادرار  
 ۲) تنگ شدن مردمک، تکرر ادرار  
 ۳) کاهش رفلکس‌ها، یبوست، تاکی کاردیا  
 ۴) گشاد شدن مردمک، تاکی کاردیا، احتباس ادرار
- ۱۲۰- در ضمن صحبت پرستار با مددجو، مددجو می‌گوید: «من از شوهرم متنفر هستم». پرستار می‌گوید: «شما از شوهرتان عصبانی و ناراحت هستید». پرستار کدام استراتژی را به کار برده است؟  
 ۱) بیان احساس خودش  
 ۲) انعکاس احساسات  
 ۳) بازخورد و انعکاس احساسات  
 ۴) بازخورد
- ۱۲۱- مددجویی به علت ابتلا به سرطان، در مرحله پایانی زندگی است. پرستار باید کدام اقدام زیر را به عنوان مهم‌ترین اقدام در نظر گیرد؟  
 ۱) رو به قبیله قرار دادن مددجو  
 ۲) کنترل درد  
 ۳) روحیت روحی  
 ۴) حمایت تغذیه‌ای
- ۱۲۲- افسردگی بعد از زایمان، معمولاً چه مدت بعد از زایمان شروع می‌شود؟  
 ۱) سه هفته  
 ۲) چهار ماه  
 ۳) یک ماه  
 ۴) چهل هفته
- ۱۲۳- پرستار فردی را با اختلال رفتاری به درمانگاه معرفی می‌کند. این اقدام پرستار، براساس کدام نقش او انجام می‌گیرد؟  
 ۱) آموزشی  
 ۲) پیشگیری  
 ۳) مشاوره‌ای  
 ۴) درمانی
- ۱۲۴- بهترین روش برقراری ارتباط با کودکان، کدام یک از از روش‌های زیر است?  
 ۱) نقش درمانی  
 ۲) محیط‌درمانی  
 ۳) گروه‌درمانی  
 ۴) بازی درمانی

- ۱۲۵- ارتباط دارای اجزایی است. اجزای اصلی ارتباط کدام‌اند؟
- (۱) فرستنده، گیرنده، پیام، بازخورد
  - (۲) کanal ارتباطی، گیرنده، فرستنده، عالیم
  - (۳) فرستنده، گیرنده، عالیم بدئی، بازخورد
  - (۴) فرستنده، گیرنده، پیام، تن صدا

بهداشت جامعه:

- ۱۲۶- منظور از کلمه اولیه، در خدمات بهداشتی اولیه چیست؟
- (۱) خدمات خاص گروه‌های آسیب‌پذیر
  - (۲) خدمات اساسی، ضروری و مناسب
  - (۳) ارائه خدمات منظم در سه سطح پیشگیری
  - (۴) مراجعه به اولین سطح شبکه
- ۱۲۷- کدام مورد در خصوص مرحله آمادگی بیماری، صحیح است؟
- (۱) خطی که عوامل غیرقابل تغییر و قابل تغییر را از هم جدا می‌کند.
  - (۲) در این مرحله، تغییرات اعضا از نظر ساختمان و عملکرد مشهود است.
  - (۳) خطی که بالای آن، بیماری به صورت عالیم و نشانه‌ها قابل تشخیص است.
  - (۴) بیماری ظاهر نشده، ولی شالوده آن ریخته شده است.
- ۱۲۸- ویژگی در غربالگری، به توانایی آزمون در کدام مورد گفته می‌شود؟
- (۱) تشخیص درست کسانی که بیمار نیستند.
  - (۲) تشخیص نادرست کسانی که بیمار هستند.
  - (۳) تشخیص درست کسانی که بیمار نیستند.
- ۱۲۹- محل نگهداری کدامیک از واکسن‌ها، در طبقه میانی یا پایینی یخچال است؟
- (۱) فلح اطفال
  - (۲) ب.ث.ژ
  - (۳) هپاتیت ب
  - (۴) MMR
- ۱۳۰- رسیدگی به والدین سالم‌مند زن و مرد، در کدامیک از مراحل تکاملی خانواده، بارزتر است؟
- (۱) خانواده دارای نوجوان
  - (۲) خانواده دارای جوان
  - (۳) خانواده در میانسالی
  - (۴) خانواده در میانسالی
- ۱۳۱- در کدام مرحله از مراحل بازدید منزل، فرایند پرستاری اجرا می‌شود؟
- (۱) مقدماتی
  - (۲) قبل از بازدید
  - (۳) بازدید منزل
- ۱۳۲- در کدام قسمت از کار با خانواده، پرستار بهداشت متوجه سابقه بیماری مزمن در فرد سالم‌مند خانواده می‌شود؟
- (۱) بررسی و شناخت
  - (۲) تشخیص پرستاری
  - (۳) اجرا و ارزشیابی
  - (۴) برنامه‌ریزی
- ۱۳۳- کدامیک از اقدامات زیر، هنگام وقوع بلایا در اولویت است؟
- (۱) بهسازی محیط و مواد غذایی
  - (۲) مبارزه با جوندگان و بندپایان
  - (۳) نجات مصدومین و مجروهین
  - (۴) مبارزه با جانوران از جهات پرخطر با یکدیگر به تناوب
- ۱۳۴- در رابطه با اصول کلی پیشگیری از بیماری‌های ناشی از کار، جایگزینی به کدام معنی است؟
- (۱) جایه‌جایی کارگران از جاهای پر خطر با یکدیگر به تناوب
  - (۲) استفاده از موادی که بیماری زایی کمتری دارند.
  - (۳) استفاده از تکنیک‌های اتوماتیک و مکانیکی
  - (۴) جدا کردن کارگران از محوطه آلوده محیط با عوامل زیان‌آور
- ۱۳۵- در کدامیک از بحران‌ها، پیشگیری سطح اول کمک‌کننده‌تر است؟
- (۱) ورود به مرحله بلوغ
  - (۲) سیل و زلزله
  - (۳) ازدستدادن شغل
  - (۴) مرگ عزیزان

بخش‌های ویژه:

۱۳۶- پرستار بخش مراقبت ویژه، در مراقبت از بیمار با تشخیص ضربه مغزی، به افزایش فشار داخل جمجمه مشکوک می‌شود. او به کدامیک از علایم زیر، دال بر افزایش فشار داخل جمجمه مشکوک می‌شود؟

- (۱) سردرد، استفراغ ، عدم تعادل
- (۲) ادم پاپی، سرگیجه، استفراغ

۱۳۷- پرستار در مراقبت از بیمار مبتلا به انفارکتوس میوکارد همراه با درد قفسه، کدام اقدام زیر را در اولویت قرار می‌دهد؟

- (۱) دادن اکسیژن با جریان پایین
- (۲) تزریق سولفات مرفین
- (۳) دادن نیتروگلیسرین زیرزبانی
- (۴) تغییر وضعیت بیمار

۱۳۸- پرستار در مراقبت از بیمار دارای close chest drainage بعد از جراحی باز قلب، به کدام موارد زیر توجه می‌کند؟

- (۱) کنترل خون روش در ظرف جمع آوری
- (۲) تشویق بیمار به حرکت شانه و بازو

۱۳۹- بهترین وضعیت بدن بیمار مبتلا به ادم حاد ریه، با هدف بهبود اکسیژن‌رسانی و تهویه کدام است؟

- (۱) نیمه‌نشسته
- (۲) طاقباز

۱۴۰- موج T در الکتروکاردیوگرام، نماینده کدام فعالیت قلبی است؟

- (۱) دپولاریزاسیون دهلیزها
- (۲) ریپولاریزاسیون شبکه پورکنژ
- (۳) ریپولاریزاسیون بطنی
- (۴) سیستول بطنی

۱۴۱- پرستار بسمار تحت پمپ، بالون داخل آئورت (IABP) را از کدام نظر، مورد بررسی قرار می‌دهد؟

- (۱) هیپوترمی
- (۲) تشنج

۱۴۲- پرستار در بیماری با تشخیص بیماری‌های انسدادی مزمن ریه همراه با استفراغ، انتظار دارد که دچار کدام اختلال اسید و باز باشد؟

- (۱) آکالالوز متابولیک، اسیدوز تنفسی
- (۲) آکالالوز تنفسی، اسیدوز متابولیک
- (۳) آکالالوز متابولیک، آکالالوز تنفسی
- (۴) آکالالوز تنفسی

۱۴۳- مهم‌ترین دارو در احیای قلبی ریوی پیشرفت‌ههای با مکانیسم اثر افزایش دهنده پرفیوژن کرونر و مغز از طریق تحریک‌گیرنده‌های بتا در عروق مغز و کرونر، کدام است؟

- (۱) ایزوپرترنول
- (۲) اپی‌نفرین
- (۳) بی‌کربنات سدیم
- (۴) لیدوکائین

۱۴۴- در کدامیک از روش‌های اکسیژن‌درمانی در بیمار مبتلا به نارسایی حاد تنفس، پرستار مجاز به دادن حداقل ۶ لیتر اکسیژن در دقیقه است؟

- (۱) ماسک ساده
- (۲) ماسک ذخیره‌ای
- (۳) ماسک ونچوری
- (۴) کانول بینی

۱۴۵- کدامیک از آریتمی‌های زیر، دارای مشخصه «یک نوع تاکی‌کاردی فوق بطنی با ضربان‌های سریع دهلیزی بین ۲۵۰ تا ۴۰۰ عدد در دقیقه» است؟

- (۱) فیبریلاسیون دهلیزی
- (۲) تاکی‌کاردی دهلیزی
- (۳) فلووتر دهلیزی
- (۴) تاکی‌کاردی دهلیزی چند کانونی

مدیریت:

۱۴۶- اولین مرحله در فرایند مشکل‌گشایی کدام است؟

- (۱) تدوین استانداردها
- (۲) شناسایی و تعریف مشکل
- (۳) تعیین اهداف قابل دستیابی

۱۴۷- مناسب‌ترین هدف کنترل در فرایند مدیریت چیست؟

- (۱) مقایسه عملیات طراحی شده با عملیات انجام شده
- (۲) بررسی راه حل‌های موجود
- (۳) یافتن اختلاف و انحراف از استانداردها
- (۴) تصحیح برنامه‌ریزی اولیه